

USO DE MEDICAMENTOS NA LACTAÇÃO



A FARMÁCIA CLÍNICA DO HOSPITAL MÁRCIO CUNHA ALERTA SOBRE O USO DE MEDICAMENTOS DURANTE A AMAMENTAÇÃO:

- Não inicie nem interrompa o uso de medicamentos por conta própria. Consulte sempre o médico!
- Alguns medicamentos passam para o leite materno em quantidades suficientes para causar riscos à saúde da criança.
- Se a mãe necessitar do medicamento, deve utilizar antes do período de sono mais longo do bebê ou imediatamente após amamentar.
- Quando necessário, deve-se suspender a amamentação enquanto utiliza um medicamento, como os antineoplásicos (tratamento do câncer) e radiofármacos.
- Se orientação médica, interrompa a amamentação se o medicamentos é totalmente contraindicado para o bebê, mas é necessário para a saúde da mãe.



Nessas circunstâncias, a mãe poderá fazer um estoque prévio de leite materno ordenhado, visando suprir a demanda da criança enquanto a amamentação estiver suspensa e manter ordenhas frequentes para garantir a produção e prevenir problemas decorrentes de ingurgitamento mamário.

DROGAS DE VÍCIO/ABUSO

Nenhuma droga ou substância que cause dependência pode ser ingerida pelas mães lactantes, não só pelos efeitos sobre a criança, mas também pelos danos à saúde física e emocional das mesmas.

DROGAS	PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DA AMAMENTAÇÃO
Alcool (etanol)	2 horas para cada drink* consumido
Anfetamina e ecstasy	24 a 36 horas
Cocaína e crack	24 horas
Fenciclidina	1 a 2 semanas
Heroína e morfina	24 horas
LSD	48 horas
Maconha	24 horas

*Um drink corresponde a 340ml de cerveja, 141ml de vinho, 42ml de bebidas destiladas.

IMPORTANTE

Em caso de dúvidas consulte o médico e o site E-lactancia, lá você encontrará informações sobre os medicamentos e contraindicações durante a amamentação. <https://www.e-lactancia.org/>